

**CATALOGO DELLE
SPECIE ORGANICHE
FOSSILI RACCOLTE
NELLE ALPI VENETE
DAL PROFESSORE...**

Tommaso Antonio Catullo



2552
Sci.

CATALOGO
DELLE
SPECIE ORGANICHE FOSSILI

RACCOLTE NELLE ALPI VENETE

DAL PROFESSORE

TOMMASO A. CATULLO

DA ESSO DONATE

AL GABINETTO DI STORIA NATURALE

DELL' I. R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

**E DELLE QUALI SI LEGGONO LE DESCRIZIONI ACCOMPAGNATE DALLE FIGURE,
SIA NEI GIORNALI SCIENTIFICI DI PAVIA, DI PADOVA E DI BOLOGNA, SIA
NEGLI ATTI DI ACCADEMIE, E NELLA ZOOLOGIA FOSSILE DELLE PROVINCE
VENETE, STAMPATA NEL MDCCCXXVII.**



PADOVA
COI TIPI DI ANGELO SICCA

1842



ZOOLOGIA FOSSILE DEL TERRENO DI SEDIMENTO INFERIORE
E DI SEDIMENTO MEDIO, COMPRESA LA CRETA.

1. *Ammonites spiniferus* Catullo. — Arenaria rossa antica del Zoldiano. — Giornale di Brugnatelli 1824.
2. *Productus? pecteniformis* Cat. — Ivi. — Zoologia fossile, pag. 47.
3. *Terebratula dubia* Cat. — Modelli nel calcare alpino del Cadore. — Ivi, tav. I. fig. C. pag. 139.
4. *Spirifer integrus* Cat. — Muschelkalk di Rovigiana nel Vicentino. — Ivi, pag. 118-119.
5. *Posidonia socialis* Münster. — Detto di Rovigliana e di Borca nel Cadorino. — Ivi, pag. 118.
6. *Tellina Recoarensis* Cat. — Sasso della Limpia a Recoaro. — Ivi, pag. 117.
7. *Terebratula trigonella* Schloth. — Rovigliana nel Vicentino. — Ivi, pag. 118.
8. *Terebratula aculeata* Cat. — Ivi. — Ivi, tav. I. fig. B, b.
9. *Terebratula bicostata* Cat. — Ivi. — Ivi, tav. I. fig. A, 1.
10. *Terebratula vulgaris* Schloth. — Ivi, — Ivi, pagina 118 e seg.
11. *Terebratula elongata* Schloth. — Ivi. — Ivi, pagina 120.
12. *Solenites mytiloides* Schloth. — Ivi. — Ivi, pagina 117.
13. *Turbo incertus* Cat. — Ivi. — Ivi, tav. I. fig. A, 4.

14. *Encrinites liliformis* Schloth. — Muschelkalk di Rovigliana e di Borca nel Cadorino. — Ivi, pag. 121.
15. *Pentacrinites vulgaris* Schloth. — Rovigliana nel Vicentino. — Ivi.
16. *Ammonites annulatus* Schloth. — Calcare del jura del canale di Agordo. — Ivi, pag. 81.
17. *Diceras gigantaea* Cat. — Calcare jurese del Cadorino, presso Borca. — Ivi, pag. 140, tav. I. fig. D, E, F.
18. *Diceras triquetra* Cat. — Calcare del jura del Bellunese, del Feltrino, del Bresciano e del Vicentino. — È la specie più caratteristica del terreno nel quale si trova.
19. *Pecten Deluci* Cat. — Detto di Borca. — Zoologia fossile, pag. 135.
20. *Terebratula elimata* Cat. — Sochero nell'Alpago nel Bellunese. — Ivi, pag. 168, tavola V., fig. m, n, o.
21. *Terebratula lacunosa* Schloth. — Dolomia dell'Agordino. — Ivi, pag. 82-85.
22. *Terebratula pruniformis* Cat. — Specie promiscua ai due terreni del jura e della creta nel Bellunese. — Ivi, pag. 186, tav. V. fig. b, c, d.
23. *Terebratula elata* Cat. — Del calcare jurese dell'Alpago. — Ivi, pag. 166, tav. V. fig. f, g, h.
24. *Terebratula Renieri* Cat. — Ivi. — Ivi, pag. 167, tav. I. fig. i, l (i, l).
25. *Nautilus Bonelli* Cat. — Dolomia jurassica dei Sette Comuni (Asiago), e del canale di Agordo. — Annali delle Scienze naturali di Bologna 1829; ed Atti dell'Accademia di Padova, vol. V. tavola II. fig. 5.

26. *Isocardia oblonga* Cat. — Argilla cinerea che soggiace alla lignite del calcare ammonitico del Veronese — Zoologia fossile, pag. 251.

FOSSILI ORGANICI DEL CALCARE AMMONITICO
DELLE PROVINCE VENETE.

27. *Ammonites turgescens* Cat. — Calcare di Torri nel Veronese. — Giornale di Brugnattelli, Bim. VI. 1820.
28. *Ammonites subcolubratu*s Cat. — Detto delle Sine nel Veronese. — Ivi.
29. *Ammonites Herveyi* Sowerby. — Calcare ammonitico di Torri nel Veronese, e di Lavazzo nel Bellunese. — Ivi.
30. *Ammonites subannulatus* Cat. — Detto di Torri e di Lavazzo. — Ivi.
31. *Ammonites Noricus* Schloth. — Detto rosso di Lavazzo. — Ivi.
32. *Ammonites bifurcatus* Schloth. — Detto delle Sine nel Veronese. — Ivi.
33. *Ammonites Theodosia* Deshayes. — Detto dei Sette Comuni nel Vicentino.
34. *Ammonites carinatus* Bruguiier. — Detto della Valle Pantena nel Veronese.
35. *Ammonites varians?* Sowerby. — Detto dei Sette Comuni. — Zoologia fossile, pag. 264.
36. *Ammonites nodulosus* Cat. — Detto di Lavazzo nel Bellunese. — Giorn. Brugn., Bim. VI. 1820.
37. *Ammonites Beudanti* Brongniart. — Detto grigio di Lavazzo.
38. *Hamites costatus* Cat. — Detto di Salzaro nel Veronese.

39. *Scaphites Labatii* Cat. — Detto di Lavazzo.
40. *Terebratula bullata* Cat. — Detto dei Sette Comuni nel Vicentino.
41. *Terebratula Brocchi* Cat. — Detto, e calcare della creta del Veronese e del Vicentino. — Zoologia fossile, pag. 268, tav. V. fig. A.
42. *Terebratula turgidula* Cat. — Detto di Marana nel Vicentino. — Annali delle Scienze naturali di Bologna 1844, tomo VI. pag. 129.
43. *Terebratula antinomia* Cat. — Detto, e calcare della creta delle Provincie Venete. — Zoologia fossile, tav. V. fig. 5; ed Atti dell'Accademia di Padova, vol. V. tav. II. fig. 2 c, d.
44. *Terebratula deltoidea* Lam. — Calcare della creta del Veronese. — Ivi.
45. *Terebratula mutica* Cat. — Calcare ammonitico e calcare della creta dei Sette Comuni nel Vicentino, e delle Sine nel Veronese. — Ivi.
46. *Nautilus lineatus* Cat. — Detto rosso sabbionoso del Bellunese. — La specie si ripete nel calcare rosso degli Apennini (Perugia).

FOSSILI ORGANICI DEL CALCARE NEOCOMIANO E DELLA
CRETA DELLE PROVINCE VENETE.

47. *Ammonites radians* Reineckii. — Strati inferiori del calcare bianco di Enego nel Vicentino.
48. *Ammonites planulatus?* Schloth. — Ivi. — Sei esemplari malconci o mutilati. — Calcare dell'Alpago nel Bellunese.
49. *Nerina Borsonii* Cat. — (*Turritella Borsonii*) — Zoologia fossile, pag. 170, tav. III. fig. D.
50. *Spherulites duplovalvata* Cat. — Ivi. — Atti del-

l'Accademia di Padova, volume IV. tavola I.
figura 5.

51. *Spherulites umbellata* Cat. — Ivi, ivi, fig. 2.
52. *Spherulites Da Rio* Cat. — Ivi, ivi, fig. 3-4.
53. *Spherulites Ponsiana* Archiac. — Calcare di Lusia, Sette Comuni nel Vicentino. — Mémoires de la Société Géologique de France, volume II. pag. 163, tab. XI. fig. 6.
54. *Spherulites Gazola* Cat. (*Radiolites Gazola*) — Detto del Serbaro nel Veronese. — Zoologia fossile, pag. 211, tav. III. fig. f.
55. *Hippurites turricula* Cat. — Detto dell'Alpago nel Bellunese. — Atti dell'Accademia di Padova, tom. IV. tav. IV. fig. 5.
56. *Hippurites dilatatus* Cat. — Ivi, tavola II. figura 1.
57. *Hippurites nanus* Cat. — Ivi, ivi, fig. 2.
58. *Hippurites contortus* Cat. — Ivi, fig. 3.
59. *Hippurites Fortisii* Cat. — Ivi. — Zoologia fossile, pag. 171, tav. VI. fig. A, B.
60. *Hippurites fitoideus* Cat. — Ivi, ivi, pag. 173, tavola VII. fig. A, B, C.
61. *Hippurites maximus* Cat. — Ivi. — Atti dell'Accademia di Padova, vol. IV.
62. *Hippurites fasciatus* Cat. (Specie ined.) — Calcare dell'Alpago nel Bellunese.
63. *Hippurites rugulosus* Cat. (Specie ined.) — Detto di Montefenera nel Trivigiano.
64. *Hippurites cornu-pastoris* Des Moulins. — Ivi. — Atti Accademici di Bordò 1826.
65. *Hippurites imbricatus* Cat. (Specie inedita). — Calcare grigio di monte Medea nel Friuli. —

Gl'individui di questo Ippurito sono accompagnati da modelli della stessa specie.

66. *Hippurites Zovetti* Cat. — Calcare rossiccio di Cargolo nella Dalmazia. — (Specie inedita).
67. *Baculites Alpaghina* Cat. — Calcare dell'Alpago nel Bellunese. — (Specie inedita).
68. *Amplexus flexuosus* Cat. — Ivi. — Atti dell'Accademia di Padova, vol. IV. tav. II. fig. 4.
69. *Ovula neocomiana* Cat. — Ivi, ivi, vol. IV.
70. *Podopsis arcuata* Cat. — Ivi, ivi, tav. II. fig. 6.
71. *Plagiostoma gigantaea* Sowerby. — Ivi, ivi.
72. *Inoceramus Cuvieri* Sowerby. — Ivi, ivi.
73. *Inoceramus annulatus* Gold. — Calcare di Magrè presso Schio nel Vicentino.
74. *Pentacrinites vulgaris* Schloth. — Calcare di Val Pantena presso Lugo nel Veronese. — Esempolari parte isolati, e parte inviluppati nella roccia.
75. *Crania nummulus* Lam. — Calcare della creta di S. Ambrogio nel Veronese.
76. *Alcionium*..... — Specie diverse tratte dalla creta dei Sette Comuni, unitamente a due Carpoliti bituminizzati.
77. *Patella scutellata* Cat. — Creta di Lusiana nei Sette Comuni nel Vicentino, e di Grezzana nel Veronese. — (Specie grande, inedita).
78. *Fungia cyclolites* Cat. — Ivi. — (Specie inedita).

ECHINIDI.

79. *Fibularia discoidea* Cat. — Calcare della creta di Grezzana. — Giornale di Brugnatelli, Bim. IV. 1820.
80. *Spatangus amygdala* Cat. (*Holaster* Agassiz). —

- Detto del Veronese. — Zoologia fossile, pagina 224.
81. *Spatangus Lamarckii* Cat. (*Holaster* Ag.) — Detto. — Ivi, pag. 223, tav. II. fig. F, i.
82. *Spatangus intermedius* (*Holaster intermedius* Ag.) — Detto di Frassenelle negli Euganei.
83. *Spatangus cor anguinum* Lam. (*Micraster* Ag.) — Detto di Novale nel Vicentino, e di Grezzana nel Veronese. — Zoologia fossile, pag. 225.
84. *Spatangus bufo* Brogniart. — Detto di Galio nei Sette Comuni nel Vicentino.
85. *Spatangus prunella* Lam. — Detto, ivi.
86. *Spatangus? subglobosus* Cat. (*Holaster? subglobosus* Ag.) — Detto di Novale nel Vicentino. — Esemplare malconcio, nel quale sono smarriti gli ambulacri.
87. *Nucleolites obesus* Cat. — Detto di S. Gio. Illarione nel Vicentino. — Questa specie ammette alcune differenze dipendenti dall'età. — Zoologia fossile, pag. 227, tav. II. fig. B, b.
88. *Nucleolites subtrigonatus* Cat. — Detto, ivi, e di Frassenelle negli Euganei. — Trovasi anco nel calcare ammonitico del Feltrino e dei Sette Comuni. — Ivi, pag. 226, tav. II. fig. D, d.
89. *Nucleolites cordiformis* Cat. — Detto del Vicentino e del Veronese. — Ivi, p. 319, tav. II. fig. H, h.
90. *Nucleolites convexus* Cat. (*Disaster* Ag.) — Calcare ammonitico, e della creta del Vicentino e del Veronese. — Ivi, pag. 128, tav. II. fig. G, g.
91. *Nucleolites cor avium* Cat. — Calcare della creta di S. Gio. Illarione. — Ivi, pag. 226, tav. II. fig. D, d.

92. *Nucleolites depressus* Cat. — Detto del Veronese e del Vicentino.
93. *Ananchytes conoidea* Cat. (*Ananchytes* Ag.) — Detto di Frassenelle negli Euganei.
94. *Ananchytes oblonga* Cat. — Detto, ivi. — (Specie inedita).
95. *Ananchytes pustolosa* Lam. — Detto delle Provincie Venete. — Zoologia fossile, pag. 220.
96. *Ananchites concava* Cat. — Calcare ammonitico, e calcare della creta delle Provincie Venete. — Ivi, pag. 222, tav. IV. fig. A.
97. *Cidarites nobilis* Münster. — Calcare della creta di Valle Pantena nel Veronese. — Giornale di Brugnatelli, Bim. VI. 1820.
98. *Cidarites elegans* Münster — Detto, ivi.
99. *Cidarites moniliferus* Goldfuss. — Detto di S. Ambrogio nel Veronese. — Ivi, come sopra.
100. *Cidarites crenularis* Lam. — Detto di Valle Pantena. — Zoologia fossile, pag. 232.
101. *Cidarites granulosus* Goldfuss. — Detto, ivi. — È specie promiscua al terreno terziario. — Ivi, pag. 234.
102. *Echinus miliaris*? Lam. — Detto di Grezzana nel Veronese. — Ivi, pag. 230.
103. *Echinus excavatus*? Leske. — Gold. tab. XL. fig. 42. a, b. — Ivi.
104. *Echinus granulosus*? Münster. — Calcare della creta di Rotzo, Sette Comuni nel Vicentino. — Zoologia fossile, pag. 230.
- A. Aculei ghiandiformi (*Cidarites glandiferus* Gold.) — Detto del Veronese e del Feltrino. — Ivi, pag. 236.

- B. Aculei spiniferi* (*Cidarites vesiculosus* Gold.) — Detto dei Sette Comuni nel Vicentino. — Ivi, ivi.
- C. Aculei spiniformi.* — Detto di Serbaro nel Veronese. — Ivi, pag. 235.
- D. Aculei claviformi* (*Cidarites satrapolis* Münster). — Detto presso Feltre.
- E. Aculei serrati.* — Detto di Romagnano nel Veronese. — Zoologia fossile, pagina 238; e Giornale Brugnatelli, Bim. VI. 1822, tav. VI. fig. C.
105. *Galerites conoideus* Lam. (*Conoclypus conoideus* Ag.) — Calcare della creta grigia di Rotzo nel Vicentino. — Detto Giornale, Bim. IV. 1820; e Zoologia fossile, pag. 249.
106. *Galerites coniecentricus* Cat. — Calcare della creta e del terreno terziario del Veronese. — Zoologia fossile, pag. 246; ed Atti dell'Accademia di Padova, Vol. V. tav. I. a, b.
107. *Galerites albogalerus* Lam. (*Conoclypus* Ag.) — Calcare della creta di Romagnano nel Veronese. — Zoologia fossile, pag. 243.
108. *Galerites hemisphericus* Lam. (*Galerites castanea* Ag.) — Nella focaja grigia della creta di Grezzana nel Veronese. — Ivi, pag. 249.
109. *Echinoneus scutigerus* Cat. — Calcare della creta di Valle Pantena nel Veronese. — Ivi, pagina 242.
110. *Belennites apiciconus* Blainville. — Detto dei Sarmazzi nel Veronese. — Annali delle Scienze naturali di Bologna, 1829.
111. *Belennites Blainvillii* Cat. — Detto di Valle Pantena. — Ivi, tav. V. fig. 2.

112. *Belennites cribrarius* Cat. — Detto di Grezzana nel Veronese. — Ivi, tav. V. fig. 1.
113. *Belennites semihastatus* Blain. — Creta di Grezzana. — Ivi.
114. *Belennites minimus* Blain. — Creta di Valle Pantena. — Ivi.
115. *Sphaerodus gigas* Agassiz. — Calcare della creta di S. Ambrogio nel Veronese. Denti di *Anarhicas*. — Zoologia fossile, pag. 176.
116. *Ptychodus latissimus* Ag. — Calcare ammonitico, e calcare della creta delle Provincie Venete. Denti di *Diodon*. — Ivi, pag. 149, tav. III. fig. C.
117. *Ptychodus Mortoni* Ag. — Detto di Lavazzo nel Bellunese, e calcare della creta di Valdagnò? nel Vicentino.
118. *Ptychodus polygyrus* Ag. — Calcare della creta di Breonio nel Veronese.
119. *Ptychodus mammillaris* Ag. — Detto di Valdagnò. — Zoologia fossile, pag. 149, tav. III. fig. B.

**ZOOLOGIA FOSSILE DEI TERRENI TERZIARI
DELLE PROVINCE VENETE.**

120. *Spatangus canaliferus* Lam. (*Schizaster canaliferus* Ag.) — Calcare terziario dei contorni di Verona. — Giornale di Brugnatelli, Bim. IV. 1820.
121. *Spatangus Buklandii* Goldf. — Detto di Verona.
122. *Spatangus cor testudinarium* Goldf. — Detto di Valdona nel Veronese. — Giornale suddetto, Bim. V. 1822.
123. *Spatangus acutus* Cat. — Detto di Greazzo nel Vicentino. — Ivi, Bim. IV. 1820.

124. *Spatangus abbreviatus* Cat. — Ivi. — (Specie inedita).
125. *Spatangus granularis* Cat. — Detto di Torricelle nel Vicentino, e di Valdonega nel Veronese. — Giornale suddetto, Bim. III. 1819, Bim. IV. 1820, ov'è descritto fra le specie che hanno quattro soli ambulacri.
126. *Spatangus loricatus* Cat. — Detto di Verona e di Priabona nel Vicentino. — Specie inedita.
127. *Spatangus ventrosus* Cat. — Detto di S. Pietro nel Veronese. — Giornale suddetto, Bim. III. 1819, e Bim. IV. 1820. — Questa specie ammette qualche varietà.
128. *Spatangus complanatus* Cat. — Detto di monte Pulgo presso Castelgomberto. — Ivi, Bim. III. 1819.
129. *Spatangus dilatatus* Cat. — Ivi.
130. *Spatangus depressus* Cat. — Detto di Creazzo nel Vicentino. — Ivi, Bim. IV. 1820.
131. *Scutella rotundata* Cat. — Detto glauconiano di Verona, e Glauconia terziaria di Belluno. — Ivi, Bim. IV. 1820.
132. *Scutella incavata* Cat. (*scutella* Ag.). — Detto di Monte S. Pietro nel Veronese. — Ivi, Bim. IV. 1820.
133. *Scutella nummularia* (*scutellina* Ag.). — Detto dei contorni di Verona e di Priabona nel Vicentino.
134. *Scutella polygona* Des Moulins (*Laganum reflexum* Ag.). — Detto di Castelgomberto nel Vicentino.
135. *Scutella laganum* Blainville (*Laganum Bonani*

- Klein e Agassiz). — Detto di Valdonega nel Veronese.
136. *Scutella assicellata* Cat. — Parte inferiore del calcare terziario a grani verdi. — Castello S. Felice nel Veronese.
137. *Scutella bifora* Cat. (*Lobophora truncata* Ag.) — Calcare terziario di Creazzo nel Vicentino.
138. *Clypeaster rosaceus* Lam. — Comunissimo nel calcare terziario delle Provincie Venete, e nella Glauconia di Belluno. — Giornale di Brugnatelli, Bim. V. 1822.
139. *Clypeaster crassicosatus* Ag. — Calcare terziario di Verona, e di Schio nel Vicentino. — È considerato come una varietà della specie precedente. — Ivi, ivi.
140. *Clypeaster altus* Lam. — Detto di S. Pietro nel Veronese. — Ivi, ivi.
141. *Clypeaster turritus?* Agassiz. — Detto di Verona, e Glauconia terziaria di Belluno. — È considerato qual varietà della specie precedente. — Ivi, ivi.
142. *Clypeaster fasciatus* Cat. — Detto di Verona. — Ivi, ivi.
143. *Clypeaster hemisphericus* Lam. (*Echinolampas hemisphericus* Ag.) — Detto di Verona, ov'è più comune che altrove. — Ivi, ivi.
144. *Clypeaster Brongniarti* Münster. — Detto di Valle Sordina presso Lonigo nel Vicentino.
145. *Clypeaster oviformis* Lam. — Detto di Verona. — Giornale suddetto, Bim. II. 1820.
146. *Clypeaster ovulatus* Cat. — Detto di S. Leonardo nel Veronese.

147. *Clypeaster scutatus* Cat. — Detto del Veronese e del Vicentino. — La specie si ripete nella Glauconia terziaria di Belluno. — Giornale di Brugnatelli, Bim. III. 1819.
148. *Clypeaster politus* Lam. — Calcare di monte Grumi a Castelgomberto nel Vicentino, ed in quello dei contorni di Verona. — Ivi, Bim. IV. 1820.
149. *Cassidulus ovatus* Cat. — Calcare terziario di S. Leonardo nel Veronese. — Ivi, Bim. V. 1822.
150. *Cassidulus scutella* Lam. — Ivi, ivi.
151. *Cassidulus Veronensis* Cat. — Ivi, ivi.
152. *Cassidulus planulatus* Cat. — Ivi, non lungi dalla porta di S. Giorgio. — Ivi.
153. *Echinus aurantius* Cat. — Detto di Lonigo nel Vicentino. — Ivi.
154. *Echinus ellipticus* Cat. — Ivi. — (Specie inedita).
155. *Sarcinula astroites* (1) Gold. — Terreno calcareo-trappico di Montegalda nel Vicentino.
156. *Sarcinula costata* Gold. — Calcare terziario di Castelgomberto nel Vicentino.
157. *Sarcinula organum* Lam. — Terreno calcareo-trappico della Trinità, presso Montecchio Maggiore nel Vicentino.
158. *Caryophyllopsis biformis* Cat. — Marne terziarie di Val di Lonte nel Vicentino.
159. *Caryophyllopsis bicapitata* Cat. — Terreno cal-

(1) Il Catullo aveva condotto a fine la sua Opera sopra i polipai fossili, e allestiti i relativi disegni fino dall'anno 1829; ma la circostanza di doversi occupare in quel tempo d'altri lavori, e la sua traslocazione da Vicenza a Padova gli hanno impedito di pubblicarla.

careo-trappico di Montecchio Maggiore nel Vicentino.

160. *Caryophyllia turbinata* Cat. — Argilla terziari di Brendola nel Vicentino.
161. *Caryophyllia cyathum* Lam. — Brecciola di Roncà nel Veronese.
162. *Caryophyllia plicata* Cat. — Calcare terziario di S. Urbano presso Montecchio Maggiore nel Vicentino.
163. *Caryophyllia succincta* Cat. (*Cyathophyllum* Gold.) — Terreno calcareo-trappico di Montecchio Maggiore e di Brendola nel Vicentino.
164. *Caryophyllia lemurea* Cat. — Calcare terziario di Creazzo nel Vicentino.
165. *Caryophyllia astreata* Cat. — Detto di Castelvomberto nel Vicentino.
166. *Caryophyllia musicalis* Lam. — Terreno calcareo-trappico della Crosetta presso Vicenza.
167. *Caryophyllia antophyllum* Lam. — Calcare terziario di Castelvomberto.
168. *Caryophyllia obconica* Münster. — Detto di Creazzo nel Vicentino.
169. *Caryophyllia cylindrica* Cat. (*Cyathophyllum* Gold.) — Detto della Crosetta presso Vicenza. (Pei fossili di questa località si veggia il Bim. II. del Giornale di Brugnatelli, anno 1819.)
170. *Turbinolia elugea* Cat. — Brecciola decomposta della Crosetta.
171. *Turbinolia biplicata* Cat. (*Turbinolia didyma*? Gold.) — Calcare terziario di monte Grumi a Castelvomberto nel Vicentino.
172. *Turbinolia incurvata* Cat. — Ivi.

173. *Turbinolia interrupta* Cat. — Detto di S. Urbano presso Montecchio Maggiore nel Vicentino.
174. *Turbinolia cyathoides?* Lam. (*Cyathophyllum plicatum* Gold.) — Marne terziarie di Val di Lonte nel Vicentino.
175. *Turbinolia ceratites* Cat. (*Cyathophyllum ceratites* Gold.) — Brecciola di Roncà nel Veronese.
176. *Turbinolia imbutioides* Cat. — Calcare terziario della Trinità presso Montecchio Maggiore nel Vicentino.
177. *Turbinolia inflata* Cat. — Ivi.
178. *Turbinolia mitrata* Cat. — Marne di Val di Lonte nel Vicentino.
179. *Turbinolia maxima* Cat. — Calcare terziario dei contorni di Verona.
180. *Turbinolia cornicula* Cat. (*Caryophyllia cornicula?* Lesueur). — Terreno terziario di monte Lanzata e di S. Luca nel Vicentino.
181. *Turbinolia appendiculata* Brongniart. — Brecciola di Roncà nel Veronese.
182. *Fungia hemisphaerica* Cat. — Ivi. — Differisce dalla *F. polymorpha* e dalla *radiata* di Goldfuss (fig. 6-8, tab. XIV), con le quali mostra di avere qualche analogia. (Specie inedita)
183. *Astrea confluens* Gold. — Calcare terziario di monte Grumi a Castelvomberto nel Vicentino.
184. *Astrea elianthoides* Gold. — Ivi.
185. *Astrea siderea* Lam. — Brecciola della Crosetta presso Vicenza.
186. *Astrea Rotula?* Gold. — Calcare terziario di Creazzo nel Vicentino.

487. *Astrea funesta* Brong. — Marne terziarie di Val di Lonte e di Brendola nel Vicentino.
488. *Astrea geminata* Gold. — Brecciola della Crosetta presso Vicenza.
489. *Astrea ananas* Lam. — Ivi.
490. *Astrea radiata* Lam. — Calcare terziario della Trinità presso Montecchio Maggiore nel Vicentino.
491. *Astrea macrophthalma?* Gold. — Detto di Creazzo nel Vicentino.
492. *Meandrina areolata* Lam. — Brecciola della Crosetta presso Vicenza.
493. *Meandrina labyrinthica* Lam. — Calcare terziario di Creazzo nel Vicentino.
494. *Meandrina collinaria* Cat. — Ivi.
495. *Meandrina filograna* Lam. — Ivi.
496. *Favosites alveolata* Lam. (*Cyathophyllum* Gold.) — Ivi.
497. *Calamopora?* Gold. — Calcare terziario di monte Grumi a Castelgomberto nel Vicentino.
498. *Calamopora polymorpha* Gold. — Ivi.
499. *Columnaria alveolata* Gold. — Terreno calcareo-trappico di Montecchio Maggiore nel Vicentino, e del calcare della creta del Veronese. — Giornale di Brugnatelli, Bim. II. 1819.
200. *Eunomia? radiata* Lamourux. — Calcare terziario della Costa Bissara nel Vicentino.
201. *Monticularia Bourguetii* Lam. — Detto delle Prov. Ven., e Glauconia terziaria di Belluno.
202. *Monticularia microconos* Lam. — Detto di Creazzo nel Vicentino.
203. *Madrepora cariosa* Gold. — Ivi.

204. *Madrepora caolescens?* Gold. — Ivi.
205. *Madrepora palmata?* Gold. — Ivi.
206. *Madrepora limbata?* Gold. — Ivi, e nel calcare terziario modificato di Lugo, non lungi da Leonedo nel Vicentino.
207. *Madrepora digitata* Cat. — Calcare terziario delle Bregonze presso Lugo nel Vicentino.
208. *Madrepora madreporacea* Gold. — Detto modificato di S. Luca, presso Lugo nel Vicentino.
209. *Cellepora megastoma?* Lam. — Ivi.
210. *Scyphia infundibuliformis?* Gold. — Detto di Creazzo nel Vicentino.
211. *Scyphia botrioidea* Cat. (*Alcyonites texturata?* Schlot) — Detto dei contorni di Verona, e calcare della creta della Valle Pantena nel Veronese. — Giornale di Brugnatelli, Bim. II. 1819.
212. *Serpula spirulaea* Lam. — Detto del Veronese, e marne terziarie di Asolo nel Trivigiano. — Giorn. Brugn., Bim. VI. 1820, tav. VII. fig. 3.
213. *Serpula fascicularis* Lam. — Detto ittiolitico di Postale nel Vicentino. — Giornale suddetto, Bim. V. 1826.
214. *Serpula Tortrix* Gold. — Marne terziarie di Priabona e di Castelgomberto nel Vicentino.
215. *Sabella rectangula* Linn. — Calcare terziario di Nanto e di Costoza nel Vicentino.
216. *Teredina personata* Lam. — Marne superiori terziarie di Asolo nel Trivigiano.
217. *Lombricaria intestinum?* Münster. — Marne terziarie di Val di Lonte nel Vicentino.
218. *Encrinus moniliformis* Müller. — Calcare terziario di Quinto nel Veronese. — I fusti di que-

sto Eucrinio si ripetono nel calcare della creta degli Euganei. — *Giornale delle Scienze di Treviso*, 1829.

219. *Terebellum obvolutum* Brong. — Detto di Leonedo e di Creazzo nel Vicentino. — *Giornale di Brugnatelli*, Bim. V. 1826.
220. *Terebellum fusiforme* Lam. — Ivi, e calcare terziario di Valle Molon e Roncà nel Veronese.
221. *Discolites microscopica* Cat. — Terreni terziarii del Veronese, del Vicentino e del Padovano. — *Giornale dell'Italiana Letteratura*, Bim. di Settembre e Ottobre 1828.
222. *Discolites lenticularis* Cat. — Ivi, ivi.
223. *Discolites complanata* Cat. — Terreno calcareo-trappico del Vicentino.
224. *Discolites onychomorpha* Cat. — Terreni terziarii del Padovano, della Valle di Lonte nel Vicentino, e dei contorni di Verona. — *Giornale suddetto*, ivi.
225. *Discolites camerina* Cat. — Terreno terziario di Priabona nel Vicentino.
226. *Discolites globularia* Lam. — Calcare terziario di Val Nera nel Vicentino, e Brecciola di Teolo nel Padovano. — *Giornale suddetto*.
227. *Discolites pulvinata* Cat. — Valle di Sangonini nel Vicentino.
228. *Discolites communis* Cat. — Terreni terziarii del Veronese e del Vicentino.
229. *Discolites Liviana* Cat. — Brecciola di Teolo. — *Giornale suddetto*.
230. *Discolites mammilla* Auct. — Ivi. — Fontana del ferro presso Verona. — Ivi.

- 231. *Discolites maxima* Cat. — Calcare terziario di Pojana e di Valdonega nel Veronese. — Il diametro attinge a cinque centimetri.
- 232. *Discolites papyracea* Cat. — Detto di S. Felice nel Veronese.
- 233. *Discolites distans* Cat. (*Numm. distans* Deshayes). — Detto del Vicentino (non creta).

DENTI D'ITTIOLITI.

- 234. *Otodus obliquus* Agassiz. — Marne terziarie di Val di Lonte nel Vicentino.
- 235. *Lamna crassidens* Ag. — Glauconia terziaria di Caverzano nel Bellunese.
- 236. *Otodus appendiculatus* Ag. — Calcare ittiolitico di Postale e di Bolca nel Veronese.
- 237. *Lamna elegans* Ag. — Calcare terziario del Veronese e del Vicentino, e Glauconia terziaria di Belluno.
- 238. *Notidanus primigenius* Ag. — Glauconia grigia di Belluno.
- 239. *Hemipristis serra* Ag. — Ivi.
- 240. *Carcharias productus* Ag. — Marne terziarie di Val di Lonte nel Vicentino.
- 241. *Carcharias heterodon* Ag. — Dette di Valdaro nel Vicentino.
- 242. *Carcharias polygyrus* Ag. — Ivi.
- 243. *Carcharias semiserratus* Ag. — Calcare terziario del Vicentino, e Glauconia grigia di Belluno. — Giornale di Brugnatelli, Bim. VI. 1824.
- 244. *Carcharias sulcidens* Ag. — Marne terziarie di Val di Lonte, e Glauconia grigia di Belluno. — Ivi, ivi.

245. *Carcharias Megalodon* Ag. — Ivi, ivi.
 246. *Galeus minor* Ag. — Calcare terziario del Vicentino, e Glauconia del Bellunese.
 247. *Myliobates micropleurus* Ag. — Brecciole di Roncà, e calcare terziario dei contorni di Verona. — Giornale di Brugnatelli, Bim. VI. 1820, e Bim. I. 1821, ov' è figurato il dente.

CONCHIGLIE UNIVALVI.

248. *Delphinula calcar* Lam. — Calcare terziario dei contorni di Verona.
 249. *Trochus Benettiae* Sow. — Terreno calcareo-trappico del Vicentino.
 250. *Trochus agglutinans* Lam. — Calcare terziario di Castelgomberto nel Vicentino.
 251. *Trochus cumulans* Brong. — Ivi.
 252. *Trochus Lucasianus* Brong. — Terreno calcareo-trappico del Vicentino. •
 253. *Trochus Boscianus* Brong. — Ivi.
 254. *Trochus tornatus* Cat. — Calcare terziario di Castelgomberto.
 255. *Trochus margaritaceus* Deshayes. — Comunissimo nel calcare terziario del Vicentino.
 256. *Trochus dentellatus* Cat. — Detto di Castelgomberto.
 257. *Turbo cingulatus* Cat. — Brecciola di Valle Sangonini, e calcare terziario di Montecchio Maggiore nel Vicentino.
 258. *Turbo Asmodei* Brong. — Calcare terziario di Castelgomberto.
 259. *Turbo scobina*? Brong. — Terreno calcareo-trappico del Vicentino.

260. *Turbo tricarinatus* Cat. — Calcare terziario di monte Pulgo nel Vicentino.
261. *Turritelle* (modelli) della Glauconia terziaria di Belluno.
262. *Cerithium corvinum* Cat. — (*Rostellaria corvina* Brong.) — Terreno calcareo-trappico del Vicentino. — Zoologia fossile, pag. 337.
263. *Cerithium subnodosum* Cat. — Brecciola di Roncà nel Veronese.
264. *Cerithium echinatum* Cat. — Calcare terziario di Grancona e di Castelgomberto nel Vicentino.
265. *Cerithium Bolcanum* Cat. — Detto ittiolifero di Bolca nel Veronese.
266. *Cerithium gibbosum* Cat. — (non Defrance). — Detto di Castelgomberto nel Vicentino.
267. *Cerithium Selenati* Cat. — Calcare terziario di Cormons nel Friuli.
268. *Cerithium Castellini* Brong. — Terreno calcareo-trappico di Roncà nel Veronese.
269. *Cerithium baccatum* Defrance. — Brecciola di Roncà.
270. *Cerithium Maraschini* Brong. — Ivi.
271. *Cerithium calcaratum* Brong. — Ivi.
272. *Cerithium bicalcaratum* Brong. — Ivi.
273. *Cerithium sulcatum* Bruguièr. — Ivi.
274. *Cerithium corrugatum?* Brong. — Ivi.
275. *Cerithium trotula* Cat. — Calcare terziario di Grancona.
276. *Cerithium retusum* Cat. — Detto di Cormons nel Friuli.
277. *Cerithium granatinum* Cat. — Detto di Creazzo nel Vicentino.

278. *Cerithium ampullosum* ? Brong. — Ivi.
279. *Cerithium plicatum* Lam. — Terreno calcareo-trappico di Roncà nel Veronese.
280. *Cerithium Ranelloideum* Cat. — Calcare terziario di Creazzo nel Vicentino.
281. *Cerithium multisulcatum* Brong. — Detto di Castelvomberto nel Vicentino.
282. *Cerithium combustum* DeFrance. — Glauconia terziaria di Belluno, e Brecciola di Roncà nel Veronese.
283. *Cerithium lemniscatum* Brong. — Brecciola di Roncà.
284. *Cerithium stropus* Brong. — Calcare terziario di Creazzo e di Castelvomberto nel Vicentino.
285. *Cerithium giganteum* Lam. — Brecciola di Roncà.
286. *Pleurotoma labiata* Desh. — Ivi.
287. *Fusus pyramidatus* Cat. (*Voluta pyramidella* ? Brocchi). — Brecciola di Valle Sangonini nel Vicentino.
288. *Fusus polygonus* Brong. (Tab. IV. fig. 3. a) — Brecciola di Roncà.
289. *Fusus polygonus* Brong. (Var. Tab. IV. fig. 3. b.) — Calcare terziario di Castelvomberto nel Vicentino.
290. *Fusus angulosus* Cat. (*Murex angulosus* Brocchi). — Ivi.
291. *Fusus longaevus* Lam. — Brecciola di Roncà.
292. *Fusus rugosus* Desh. (Var. b. Tab. LXXV. figure 10-11). — Calcare terziario di Lonigo nel Vicentino.
293. *Fusus subcarinatus* Lam. — Brecciola di Montecchio Maggiore nel Vicentino.

294. *Fusus muricoides* Desh. — Brecciola di Roncà nel Veronese, e di Valle Sangonini nel Vicentino.
295. *Strombus Fortisii* Brong. — Ivi.
296. *Strombus Bonelli* Brong. — Calcare terziario di Castelvomberto nel Vicentino.
297. *Strombus monocerus* Cat. — Ivi.
298. *Strombus mucronatus* Cat. — Brecciola di Roncà.
299. *Pterocerus Radix* Brong. — Brecciola di Roncà, e calcare terziario di Castelvomberto.
300. *Pterocerus turricula* Cat. — Detto, e calcare terziario della stessa località.
301. *Cassis striata* Sow. — Brecciola di Valle Sangonini nel Vicentino.
302. *Cassis harpaeformis* Lam. — Detto, e calcare terziario di Castelvomberto.
303. *Cassis Thesei* Brong. — Terreno terziario di Salcedo. — Di questa specie si trovano esemplari malconci o mutilati nella Glauconia di Belluno.
304. *Cassidaria carinata*? Lam. — Marne terziarie di Priabona nel Vicentino.
305. *Voluta torulosa*? Desh. — Calcare terziario di Castelvomberto.
306. *Voluta spinosa* Lam. — Brecciola di Roncà nel Veronese (*Voluta coronata* di Brocchi).
307. *Voluta bicorona* Lam. — Brecciola di Valle Sangonini nel Vicentino.
308. *Voluta ambigua* Lam. — Ivi.
309. *Voluta crenulata* Lam. — Ivi.
310. *Voluta affinis* Brocchi. — Ivi.
311. *Arpa elegans*? Desh. — Brecciola di Roncà.
312. *Marginella phaeseolus* Lam. — Calcare terzia-

- rio di Valle de' Chiuppi presso S. Gio. Illarione nel Vicentino.
313. *Purpura hystrioides* Cat. — Detto di Castelvomberto nel Vicentino.
314. *Cyprea lyncoides* Brong. — Glauconia terziaria di Belluno, e calcare terziario del Veronese. — Giornale di Brugnatelli, Bim. VI. 1824.
315. *Conus planulatus* Cat. (Var? del *Conus alsiosus* Brong.) — Brecciola di Roncà, calcare terziario di Brendola, e Glauconia di Belluno.
316. *Conus depertitus?* Brocchi. — Brecciola di Roncà.
317. *Conus* Noè Brocchi. — Brecciole di Valle Saugonini nel Vicentino, e di Roncà nel Veronese.
318. *Conus pyramydatus* Cat. — Brecciola di Roncà. — Giornale di Brugnatelli, Bim. VI. 1824.
319. *Conus antediluvianus* Brug. — Ivi.
320. *Conus diversiformis* Desh. — Brecciola di Roncà, marne di S. Luca nel Vicentino, e Glauconia di Belluno.
321. *Conus diversiformis* Desh. — Varietà più grande di monte Casella in Castelvomberto.
322. *Pileopsis ingens*, Cat. — Brecciola di Roncà.
323. *Pileopsis cornucopiae* Lam. — Detta.
324. *Pileopsis dilatata* Lam. — Detta, e Glauconia di Belluno.
325. *Bulla striatella* Lam. — Calcare terziario di Castelvomberto.
326. *Bulla ovulata* Lam. — Ivi.
327. *Bulla cylindrica* Brug. — Ivi.
328. *Melania elongata* Brong. — Comuissima nel calcare terziario delle Valli di Trissino e di Castelvomberto.

329. *Melania costellata* Lam. — Ivi.
 330. *Melania Stygii* Brong. — Brecciola di Roncà nel Veronese.
 331. *Helis damnata* Brong. — Ivi.
 332. *Ampullaria ponderosa* Desh. — Calcare terziario di monte Castello presso Castelgomberto.
 333. *Ampullaria vulcani* Brong. — Brecciola di Roncà.
 334. *Ampullaria obesa*? Brong. — Ivi.
 335. *Nerita conoidea* Brong. — Ivi.
 336. *Nerita gigantea* Cat. — Ivi.
 337. *Nerita Caronis* Brong. — Calcare terziario di monte Grumi, e Brecciola di Roncà.
 338. *Natica sigaretina* Desh. — Detto di Creazzo nel Vicentino.
 339. *Natica acuta*? Desh. — Brecciola di Roncà.
 340. *Sigaretus canaliculatus* Sow. — Ivi.
 341. *Nassa Caronis* Brong. — Brecciola di Roncà nel Veronese, e di Valle Sangonini nel Vicentino.
 342. *Scalaria bivaricata* Cat. — Calcare terziario di Castelgomberto nel Vicentino.
 343. *Nautilus umbilicaris* Desh. — Detto di Negraro nel Veronese, e Glauconia di Belluno. — Giornale di Brugnatelli, Bim.VI. 1820, tav.VII. fig.A.

CONCHIGLIE BIVALVI.

344. *Cardium costatum*? Lam. — Modelli tratti dal calcare di Creazzo nel Vicentino.
 245. *Cardium elongatum* Lam. — Idem, e Glauconia di Belluno.
 346. *Cardium planatum* Renieri. — Brecciola di Roncà.
 347. *Cardium edule* Lam. — Valle Sangonini.

348. *Cardium tuberculatum*? Lam. — Glauconia grigia di Puos nell'Alpago presso Belluno.
349. *Cardium tenuicostatum*? Lam. — Calcare di Creazzo nel Vicentino.
350. *Cardium hibernicum* Sow. — Ivi.
351. *Venericardia multicostata* Lam. — Calcare di Castelgomberto.
352. *Venericardia maxima* Cat. — Ivi.
353. *Isocardia cor* Lam. — Calcare di Creazzo e dei contorni di Verona.
354. *Isocardia*..... — Modelli delle marne terziarie superiori di Cavasso nel Friuli.
355. *Arca magellanoides* Desh. — Calcare dei contorni di Verona.
356. *Arca turgida* Cat. — Marne terziarie superiori di monte Molerana a Castelnovo nel Friuli.
357. *Arca affinis* Cat. — Ivi.
358. *Arca hyantula*? Desh. — Modelli con residuo di guscio. — Glauconia di Belluno.
359. *Pectunculus pulvinatus* Lam. — Calcare di Creazzo e di Costa Bissara nel Vicentino.
360. *Trigonia*..... — Modelli tratti della Glauconia di Belluno.
361. *Trigonia caudata* Ag. — Études critiq. sur les mollusques foss. Tab. VII. fig. 13. — I modelli di questa bivalve sono promiscui a più terreni.
362. *Pholadomya decemcostata*? Röm. — Calcare di Lonigo nel Vicentino.
363. *Pholadomya Æsmarkii* Pusch. — Glauconia di Tarzo nel Trivigiano.
364. *Pholodomya donacina* Voltz — Marne di S. Luca nel Vicentino.

365. *Pholodomya striata* Münster. — Ivi.
366. *Unio*..... — Modelli della Glauconia di Belluno.
367. *Solen*..... — Detti, e del calcare di Castelgomberto nel Vicentino.
368. *Chama gryphina* Lam. — Calcare dei contorni di Verona, e di Creazzo presso Vicenza.
369. *Chama lamellosa* Desh. — Terreno calcareo-trappico di Roncà nel Veronese.
370. *Mytilus dilatatus* Cat. — Calcare di Castelgomberto, e Brecciola di Roncà.
371. *Pina trigona* Auct. — Arenaria cinerea a grani fini, che soggiace alla Glauconia di Belluno.
372. *Pina tenuistria*? Münster. — Glauconia grigia, superiore alla Glauconia verde di Belluno.
373. *Perna glauconiana*. Cat. — Glauconia di Belluno.
374. *Pecten solarium*? — Ivi, e calcare di S. Leonardo presso Verona.
375. *Pecten ingens* Cat. — Calcare dei contorni di Verona. — Giornale di Brugnatelli, Bim. VI. 1824.
376. *Pecten maximus* Cat. — Ivi.
377. *Pecten bicostatus* Cat. — Ivi.
378. *Spondylus Gypidium* Cat. — Calcare di Brendola e di Castelgomberto nel Vicentino.
379. *Spondylus alpinus* Cat. (e sue varietà). — Argille di Brendola, e Glauconia di Belluno.
380. *Spondylus striatus*? Gold. — Calcare di Castelgomberto nel Vicentino.
381. *Spondylus armatus* Gold. — Ivi.
382. *Spondylus bifrons* Münster. — Marne di Val di Lonte e di Brendola.

383. *Spondylus asper*? Münster. — Calcare di Creazzo e di Priabona.
384. *Spondylus truncatus*? Gold. — Marne di Val di Lonte.
385. *Ostrea crenata* Gold. — Ivi.
386. *Ostrea pulligera* Gold. — Ivi.
387. *Ostrea flabelliformis* Nilson. — Calcare di Lorigo nel Vicentino.
388. *Ostrea nodosa* Münster. — Detto di Castelgombergo nel Vicentino.
389. *Ostrea Sparnacensis* DeFrance. — Detto di Colle di Grado presso Bassano.
390. *Ostrea crispata* Gold. — Glauconia di Belluno.
391. *Ostrea longirostris* Lam. — Detta di Tarzo nel Trivigiano, e calcare di S. Zenone nel Vicentino.
392. *Ostrea vesicularis*? Brong. (*Gryphaea dilatata* Sow.) — Marne di Val di Lonte nel Vicentino, e nel calcare della creta di Meudon in Francia.
393. *Gryphaea navicularis*? Bronn. — Brecciola di Roucà nel Veronese.
394. *Gryphaea columba* Lam. — Marne di Val di Lonte, e calcare di Montecchio Maggiore, e nel calcare second.^o della Baja di Villa Franca presso Nizza. (Brong. *Terr. calc. trappéens*, pag. 10).
395. *Gryphaea plicata* Sow. — Marne di Val di Lonte nel Vicentino, e di Brendola. — In altri paesi esiste nella creta.
396. *Gryphaea cymbium*? — Individuo adulto, riferibile alla var. *Gigantea* di Gold., tab. LXXXV. fig. 1. b. — Si dà come propria del Lias, ma appo noi si trova nelle marne terziarie di Val di Lonte (Raccolta Castellini).

397. *Gryphaea Suilla* Schloth. — Calcare terziario di Brendola, e calcare secondario della Baviera. (Gold., tab. LXXXV. fig. 5. *a*, *b*.)
398. *Inoceramus*? — Sembra una specie molto affine all' *Inoceramus* Lamarckii di Sowerby, propria della creta. — Brecciola di Roncà (Gold., tab. CXI. fig. 2).
399. *Corbis pectunculus* Lam. — Brecciola di Roncà nel Veronese.
400. *Panopaea intermedia* Sow. — Marne di S. Luca nel Vicentino, e Glauconia di Belluno.
401. *Panopaea Faujasii* Lam. — Glauconia grigia di Belluno. — A questo modello vi aderisce il *Buccinum reticulatum*, il quale conserva le tinte e la lucentezza perlacea, proprie degl'individui che vivono tuttavia nei mari.

OSSA FOSSILI DELLE ALPI VENETE.

402. *Carcharias Megalodon*? — Ossa e denti impastati nella Glauconia grigia di Belluno.
403. *Manatus*? — Coste di un grande cetaceo inviluppate nel calcare di Castelgomberto nel Vicentino.
404. *Crocodylus*.... — Frammenti di un teschio, con denti dello stesso rettile inclusi nel calcare della Favorita nel Vicentino. — NB. Ossa e falangi di un'altra specie del medesimo genere si sono scoperte a ridosso del calcare terziario de' Puli, tra Valdágno e Recoaro, le quali essendo inviluppate nel calcare ammonitico, fanno credere che sieno state slanciate colassù dalle eiezioni vulcaniche.

OSSA FOSSILI DELLA CAVERNA DI CERÈ
NEL VERONESE.

- Sus priscus.* 1.^o Mascella inferiore sinistra, con rudimenti del secondo falso molare, e due mascellari interni.
2.^o Frammento della mascella inferiore, co' suoi molari.
3.^o Molare molto grosso, isolato.
4.^o Due canini lattajuoli.
- Canis Lupus* 5.^o Due incisivi, uno mancante dell'apice.
6.^o Due canini e due falsi molari.
7.^o Mascella inferiore sinistra fornita di denti.
8.^o Frammento di mascella inferiore, in cui si vede il carnivoro quasi intiero, e l'alveolo privo del tuberculoso.
9.^o Osso mascellare superiore sinistro, con carnivoro ed altri denti.
10.^o Primo e secondo malore della mascella inferiore.
11.^o Ultimo grande molare della mascella sinistra inferiore.
12.^o Atlante privo di una delle sue ali.
13.^o Terza o quarta vertebra cervicale.
- Corvus* 14.^o Frusti di corna e denti.

OSSA FOSSILI DELLA CAVERNA DI SELVA DI PROGNO
NEL VERONESE.

- Ursus spaelcus* 15.^o Teschio, in cui si veggono gli avanzi delle arcate zigomatiche, tutti i molari, e i due canini.

- 16.° Mascellare superiore diritto con tre
molari. Appartiene ad un indivi-
duo della razza grande?
- 17.° Canini isolati.
- 18.° Capo sinistro del femore, e parte
inferiore dell'osso stesso.
- 19.° Cavità ischiatica.
- 20.° Calcagno dritto.
- 21.° Vertebra atlante.
- 22.° Vertebre dorsali.

